

附錄A 2000-2004顯示出石棉消費增長的國家

(單位：噸)

國家	2000	2004	增長 (%)	世界排行
阿塞拜疆	7,150	10,600	48%	11
中國	383,000	537,000	40%	1
印度	145,000	190,000	31%	3
印度尼西亞	42,900	51,000	20%	8
伊朗	40,700	64,300	58%	6
哈薩克斯坦	71,700	269,000	275%	2
吉爾吉斯斯坦	16,500	26,500	61%	9
巴基斯坦	1,590	9,170	477%	12
羅馬尼亞	10,700	13,000	21%	10
泰國	110,000	166,000	51%	4
烏克蘭	80,900	122,000	51%	5
越南	44,200	58,300	32%	7

根據美國地質調查局 (U.S.G.S.) 2007年2月提供的數據，在2000-2004期間，國家石棉消費最高的增長率發生在：巴基斯坦 (+477%)，哈薩克斯坦 (+275%)，吉爾吉斯斯坦 (+61%)，泰國 (+51%)，烏克蘭 (+51%)。論噸數，最大的增長量哈薩克斯坦 (197,300噸)，中國 (154,000噸)，泰國 (56,000噸)，印度 (45,000噸)，烏克蘭 (41,000噸)。¹⁰⁰

附錄B 石棉相關疾病

石棉接觸已經關聯了三種主要的致命性疾病，以延續的潛伏期為特徵：

◆ 石棉沉着症——即使石棉接觸停止，石棉纖維吸入所導致的肺狀況在以後的延續期里都是不可逆轉的。在石棉沉着症的病例中，癥痕組織硬化和肺變形，使呼吸越來越吃力；隨着對肺的血液供應變弱，肺效率的降低使心臟處於緊張。肺泡、氣囊的增厚，是由於石棉纖維作用使氧氣攝入減少和排出二氧化碳減弱，所導致的。